



 Ru  En

(495) 648-26-26 [Главная](#) [Карта сайта](#)

Поиск
 поиск по сайту по каталогу

[О компании](#)

[Где купить?](#)

[Знак качества](#)

[Партнерам](#)

[Советы и статьи](#)

[Форум](#)

[Контакты](#)

Каталог продукции

Животные Проблемы

- Кошки
- Собаки
- Птицы
- Грызуны
- Рептилии
- Рыбы
- Лошади
- С/х животные

[Главная](#) / [Каталог продукции](#) / [Бабезан 4%](#)

Бабезан 4%

[Добавить в избранное](#) Избранное (0)

Состав и фармакологические свойства.

Бабезан 4% раствор для инъекций в качестве действующего вещества в 1 мл содержит имидокарба дипропионат - 40 мг, а также вспомогательные компоненты.

Бабезан 4% раствора для инъекций – антипротозойный лекарственный препарат из группы имидазолина. Имидокарб, входящий в состав препарата, активен в отношении *Babesia bovis*, *Babesia ovis*, *Babesia bigemina*, *Babesia colchica*, *Babesia equi*, *Babesia divergens*, *Babesia canis*, *Babesia caballi*, *Babesia gibsonii*, *Francaella colchica*, *Theileria annulata*, *Theileria sergenti*, *Theileria mutans*, *Theileria orientalis*, *Theileria ovis*, *Theileria recondita*, *Theileria tarandirangiferis*, *Nuttallia equi*, *Anaplasma marginale*, *Anaplasma ovis*, а также *Ehrlichia canis*.

Механизм антипротозойного действия имидокарба связан с подавлением поступления инозитола, необходимого для жизнедеятельности кровепаразита, а также с нарушением образования и использования паразитами полиаминов.

После парентерального введения препарата терапевтическая концентрация имидокарба дипропионата в крови достигается через 18-24 часа и удерживается на пироплазмостатическом уровне в течение 4-6 недель. Накапливается имидокарб дипропионат, в основном, в почках и печени; выводится из организма преимущественно с мочой.

Бабезан 4% раствор для инъекций по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не обладает местно-раздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и мутагенными свойствами.

Показания к применению.

Бабезан 4% раствор для инъекций назначают с лечебной и профилактической целью собакам при кровепаразитарных болезнях – остром, хроническом и субклиническом бабезиозе, анаплазмозе и нутталиозе, а также при смешанных инвазиях.

Противопоказания.

Противопоказанием к применению Бабезана 4% раствора для инъекций является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается использовать лекарственный препарат в течение 4 недель после вакцинации живой вакциной против бабезиоза или анаплазмоза.

Побочные явления.

При передозировке и/или повышенной индивидуальной чувствительности животного к препарату возможно развитие осложнений (брадикардия, учащение и нарушение дыхания, анорексия, обильное слюнотечение, слезотечение, потоотделение, тремор мышц, частое мочеиспускание и дефекация). В этих случаях назначают подкожно 1 % раствор атропина, симптоматические средства и проводят десенсибилизирующую терапию.

В редких случаях возможна местная реакция в виде гиперемии или болезненной припухлости в месте введения лекарственного средства, которая исчезает самопроизвольно через 1-2 суток. Повторное введение может сопровождаться снижением кровяного давления.

Дозы и способ применения.

Собакам Бабезан 4% раствор для инъекций применяют при бабезиозе с лечебной целью однократно подкожно в дозе 4 мг имидокарба на 1 кг массы животного, что соответствует 0,1 мл/кг Бабезана 4% раствора для инъекций.

В случае обнаружения бабезий в мазке крови через сутки после применения препарата, его вводят повторно в той же дозе.

С профилактической целью при появлении клинических признаков бабезиоза или в течение недели после перемещения животных в зоны, неблагополучные по данному заболеванию Бабезан 4% раствор для инъекций применяют собакам однократно в терапевтической дозе.

Защитный эффект после инъекции препарата сохраняется в течение 4 недель.

Особые указания.

В связи с возможной болевой реакцией препарат не следует вводить в одно место крупным животным в объеме, превышающем 10 мл и мелким животным в объеме, превышающем 2,5 мл.


У животных с клиническими признаками бабезиоза до введения Бабезана 4% раствора для инъекций целесообразно применять антигистаминные лекарственные препараты. Не допускается одновременное применение Бабезана 4% раствора для инъекций с хлорорганическими, фосфорорганическими препаратами и другими ингибиторами холинэстеразы.

Хранение.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года со дня изготовления, после вскрытия флакона – не более 28 суток.

Запрещается применение Бабезана 4% раствора для инъекций по истечении срока годности.



Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.



Советы ветеринара



Владислав Абрамов
Ветеринарный врач



[О компании](#) [Где купить?](#) [Знак качества](#) [Партнерам](#) [Советы и статьи](#) [Форум](#) [Контакты](#)

ООО "НВЦ Агроветзащита" 2009, **(495) 648-26-26**

Разработка iPartner.ru